

Česká lesnická společnost, o.s.,
za finanční podpory
Ministerstva zemědělství, úsek lesního hospodářství
a Lesů České republiky, s.p.



RYCHLEROSTOUCÍ DŘEVINY– ZDROJ BIOMASY PRO ENERGETIKU

SBORNÍK REFERÁTŮ



Čtvrtek, 21. května 2009, konferenční sál na GŘ LČR, s.p.

Odborní garanti:**Ing. Josef Kubačka**

LČR, s.p., KŘ Frýdek – Místek
Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 73801
tel.: 724 523 488, e-mail: kubacka.oi11@lesycr.cz

Organizační garant:**Ing. Karel Vančura**

Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Pěstování rychlerostoucích dřevin (RRD) je součástí strategie využívání obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje. V České republice je to obor, který se nerozvíjí tak intenzivně jako v jiných zemích světa, nicméně existuje nepřetržitě od roku 1946 jako jedna ze specializací lesnického výzkumu. Za rychlerostoucí dřeviny jsou v klimatických podmínkách střední Evropy považovány především topoly a vrby. Jejich hospodářské využívání je založeno na pěstování vyšlechtěných a ověřených klonů, které jsou zárukou vysokého výnosu v různých pěstebních systémech, jejichž cílovým produktem je jak dřevo v tradičním sortimentu, tak celková biomasa porostu obnovovaného na pařezu. Rychlerostoucí dřeviny jsou proto velmi vhodné také jako alternativní zdroj energie obnovitelný ve velmi krátkých pěstebních cyklech. Ukázkou kultury s velmi krátkým obmýtím jsou výsadby, které budou prezentovány během exkurzní části semináře.

Autor souhlasí se zveřejněním svého příspěvku ve sborníku a na internetu. V případě použití kterékoli části příspěvku bude ze strany ČLS vyžadována přesná citace autora.

Texty ve sborníku neprošly jazykovou úpravou.

Technická spolupráce:**Lesnická práce, s. r. o.**

nakladatelství a vydavatelství
Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
neuhoferova@lesprace.cz

Česká lesnická společnost
ISBN 978-80-02-02110-0

Obsah

- 4** Ludka Čížková, Vladimír Čížek, VÚLHM, v. v. i.
Pěstování rychlerostoucích dřevin v České republice
- 10** Ing. Jan Weger, Ph.D. a kol., VÚKOZ, v.v.i.
Rámcová typologie zemědělských půd pro pěstování vybraných klonů topolů a vrb k energetickému využití v České republice
- 16** Ing. Josef Miškovský, Lesy České republiky, s.p.
Zkušenosti s pěstováním RRD u LČR s.p. Hradec Králové
- 20** Ing. Miroslav Trnka, CSc., Zemservis, zkušební stanice Domanínec s.r.o.
Zkušenosti s pěstováním rychlerostoucích dřevin v mikroregionu Bystřice n. P.
- 23** Ing. Jana Svobodová, KÚ Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství
Pravomoci úředníků veřejné správy při schvalovacích řízeních pro pěstování rychlerostoucích dřevin

PĚSTOVÁNÍ RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVIN V ČESKÉ REPUBLICE

Lud'ka Čížková, Vladimír Čížek
VÚLHM, v. v. i.

Klíčová slova: rychlerostoucí dřeviny, krátké obmýetí, produkce biomasy, reprodukční materiál, choroby topolů

1. Charakteristika rychlerostoucích dřevin

Produkce biomasy, zejména produkce dendromasy, byla vždycky hospodářsky nejvýznamnější vlastností pěstovaných dřevin. Skupina dřevin, které jsou označovány jako rychlerostoucí, se vyznačuje schopností dosáhnout vysoké produkce biomasy v krátkém časovém období ve srovnání s jinými druhy dřevin. Nejvíce využívanými druhy této skupiny jsou v našem zeměpisném pásmu příslušníci rodů *Populus* a *Salix* čili topoly a vrby. S rostoucími možnostmi zhodnocení barevného dřeva jsou v Evropě zakládány např. výsadby třešně ptačí (*Cerasus avium*), ořešáku černého (*Juglans nigra*) a trnovníku akátu (*Robinia pseudoacacia*). Jejich produkce je ekonomicky zajímavá v závislosti na požadovaném sortimentu již ve 40 letech. Z jehličnatých dřevin se nejčastěji pěstuje borovice lesní (*Pinus sylvestris*), douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*). Uvedené dřeviny se navzájem odlišují svými ekologickými nároky tak, že při kvalitním managementu je možné dosáhnout vysokého ekonomického efektu diferencovaným pěstováním odpovídajících druhů vzhledem k vlastnostem stanoviště. Součástí této strategie je dodržování vyzkoušených pěstebních technologií a používání ověřeného reprodukčního materiálu, kultury jsou pak obvykle zakládány na zemědělské půdě.

V České republice se v současné době projevuje zvýšený zájem o pěstování topolů a vrb.

1.1. Sortiment topolů pro krátké a velmi krátké obmýetí

Na území ČR je možné pěstovat topoly od nejnižších poloh až do nadmořské výšky okolo 900 m. Celé rozpětí vegetačních stupňů pokrývá jen topol osika (*Populus tremula*), který je však ve výsadbách využíván minimálně. Pravděpodobnou příčinou je mj. určitá náročnost vypěstování sadebního materiálu. Jednoduché vegetativní množení osními řízků, které je běžné u jiných druhů topolů, není u osiky možné a jeho využití je teprve ve stadiu výzkumu. V současné době je reprodukční materiál osiky získáván generativní cestou nebo *in vitro* metodou. Osika je však vzhledem ke své nenáročnosti na půdní typ a dostupnost spodní vody považována za perspektivní dřevinu. Její výnosovost je hodnocena v pokusných plochách VÚLHM, v nichž je porovnávána domácí osika s hybridy s americkým topolem osikovitým (*Populus tremuloides*). Do sekce našich bílých topolů patří vedle osiky také topol bílý (*Populus alba*) a topol šedý (*Populus ×canescens*), které jsou již podstatně náročnější na kvalitu stanoviště. Dobrého výnosu dosahují na půdách dobře zásobených živinami a vodou, ale prakticky téměř nejsou využívány ani při obnově lesa ani při revitalizaci krajiny. Možnosti jejich reprodukce jsou stejné jako u osiky.

V sekci černých topolů je postup množení mnohem snadnější, úspěšně zakořeňují z dřevitých řízků. Jejich pěstování však omezují vyšší ekologické nároky. K černým topolům patří vedle domácího topolu černého (*Populus nigra*) také americký topol bavlínkový (*Populus deltoides*) a topol hranatý (*Populus angulata*) a jejich vzájemné hybridy označované *Populus ×euroamericana* nebo názvem *Populus ×canadensis*. Na základě ověřování v pokusných plochách VÚLHM byla v 60. letech minulého století vypracována pěstební rajonizace hybridních klonů, která byla na konci let devadesátých završena vyhodnocením a výběrem ověřeného sortimentu produkčně nejlepších

klonů ve vazbě na stanoviště. Seznam doporučeného sortimentu hybridních topolových klonů pro zakládání porostů s krátkou dobou obmýti byl zveřejněn ve Věstníku MZe ČR v dubnu roku 2000.

Ekologické optimum pěstování topolových klonů *Populus xeuroamericana* spadá do nížin až pahorkatin s nadmořskou výškou do 400 m, na lokalitách s těžší, ale provzdušněnou půdou s dostatečnou zásobou živin a dostupnou hladinou spodní vody (minimálně 1,2 m). Při výběru sortimentu je nutné respektovat rozdíly na úrovni klonů jak v požadavcích pěstitele, tak v nárocích pěstovaných klonů. Nejvýnosnější klony, které by měly tvořit základ klonových směsí v polohách do 300 m n.m., jsou *Populus xeuroamericana* 'NL-B-132b', 'I 45/51', 'I 476' a 'Blanc du Poitou' (do 400 m n.m.). Do klonové směsi je pak možno doplňovat z klonů 'Dolomiten', 'Eckhof', 'Flachslanden', 'I 500/53' (do 300 m n.m.) nebo 'Gelrica', 'Löns', 'Heidemij', 'Neupotz' (do 400 m n.m.). V současné době pokračuje VÚLHM v programu ověřování nových evropských hybridních klonů a vlastních novošlechtěnců výzkumné stanice v Uherském Hradišti, aby bylo možné některé zastarávající klony postupně nahradit novými.

Sekce balzámových topolů je u nás nejméně známá. Dosud založené výsadby vykazují výborné produkční vlastnosti v polohách až do 700 m n.m., velmi dobře jsou tolerovány chudší štěrkovité půdy dobře zásobené vodou. V pokusných plochách VÚLHM byly již ověřovány klony amerického topolu chlupatoplodého (*Populus trichocarpa*), asijského topolu Maximovičova (*Populus maximowiczii*) a jejich vzájemných hybridů, topolu berlínského (*Populus xberolinensis*) a jeho hybridů. Pro pěstování jsou doporučeny klony 'Oxford', 'Androscoggin', 'NE 42' a 'Fritzi Pauley'.

Hospodářsky perspektivní skupinou jsou také hybridy mezi druhy sekcí černých a balzámových topolů, které jsou testovány pro pěstování v intenzivních energetických plantážích s velmi krátkým obmýtím.

Již po roce 1990 se do ČR dostaly dva klony topolů z Rakouska, které jsou u nás množeny pod různými označeními, např. J104 (MAX 5) a J105 (MAX 4). Jedná se o klony z multiklonální sorty 'Max' (*Populus nigra x maximowiczii*), které byly vyšlechtěny na vysoký výnos v hustém sponu při vysoké toleranci k patogenům a u nás vykazují velmi dobrý růst, který si udržují i na plochách, kde ostatní klony v růstu zaostávají. Mají nejvyšší ujmavost řízků ve volné půdě z dosud testovaných klonů. Jejich růstové výsledky jsou dobrým příkladem významu šlechtění odrůd na konkrétní vlastnosti, jaké vyžaduje pěstební cíl.

Další topolové klony v současné době doporučované pro energetické plantáže byly v minulosti získány do VÚLHM pro lesnický výzkum z několika světových šlechtitelských pracovišť. Jedná se o klony 'Androscoggin' (*Populus maximowiczii x P. trichocarpa*), 'Oxford' a 'NE 44' (*Populus maximowiczii xberolinensis*) z USA, klon P-468 (*Populus trichocarpa x koreana*) z Velké Británie, klon P-473 (*Populus deltoides x trichocarpa*) z Polska, klon 'Gomel 2' (blíže neurčený hybrid balzámového topolu) z bývalého SSSR. Klon P-410 totožný s P-412 (*Populus nigra x simonii*) je výsledkem novošlechtění VÚLHM. Klon 'NL-B-132b' (*Populus xeuroamericana*) z Holandska se pro dlouhodobé pěstování v hustých výsadbách neosvědčil.

Přehled klonů rychlerostoucích dřevin (topolů a vrb) schválených MŽP pro zakládání plantáží byl zveřejněn ve Věstníku MZe ČR v dubnu roku 2004.

1. 2. Sortiment vrb pro krátké a velmi krátké obmýti

Hospodářsky v ČR minimálně využívanou skupinou dřevin jsou vrby. Z bohatého rodu *Salix* roste na našem území 25 druhů. Pro porostní výsadby s krátkým obmýtím jsou vhodné stromové druhy vrba bílá (*Salix alba*) a vrba načervenalá (*Salix x rubens*), které jsou v současné době používány na lesních půdách s trvale vysokou hladinou spodní vody nebo při revitalizaci krajiny v okolí vodních ploch.

Nové možnosti pěstebního využití vrb představují intenzivní kultury pro produkci energetické biomasy. Ve VÚLHM jsou zakládány ověřovací výsadby energetických plantáží od roku 1994. Podle zahraničních zkušeností jsou nejproduktivnější druhy z okruhu vrby košíkářské a vrby jívy, které jsou u nás testovány až do nadmořské výšky okolo 600 m. V klimaticky příznivějších regionech je vhodné i použití vrby bílé, jejíž ekologické optimum je ohraničeno nadmořskou výškou okolo 400 m.

V roce 1993 byla provedena ve výzkumné stanici v Uherském Hradišti první rozsáhlá selekce zejména vrbových klonů v klonových archivech, která byla založena na výsledcích dosavadního přibližně třicetiletého výzkumu a na zkušenostech z udržovacího šlechtění. Byly vybrány domácí druhy vrb rozdílných geografických původů jako klony selektované v původních lokalitách a také klony, které vznikly vnitrodruhovým nebo mezidruhovým křížením. Tyto šlechtitelské práce probíhaly ve výzkumné stanici s výjimkou jednoho typu křížení pocházejícího z pracoviště lesnické fakulty v Brně.

Celý soubor selektovaných klonů byl poté použit k založení ověřovacích výsadeb VÚKOZ Průhonice v rámci několika navazujících výzkumných projektů MŽP a část klonů již několik let doporučuje MŽP pro výsadby plantáží.

Z okruhu vrby bílé je doporučeno 7 klonů *Salix alba*, které byly získány do VÚLHM ze šlechtitelských pracovišť v jihoevropských zemích (S-204 z Jugoslávie, S-456 a S-457 z Maďarska, S-464 a S-469 z Rumunska a S-639 z Francie), 1 klon *Salix alba* selektovaný z hybridního potomstva z novošlechtění VÚLHM (S-131), 1 klon *S. alba* (S – 117) a 2 klony *Salix x rubens* (S-195 a S-391) selektované ve VÚLHM.

Z okruhu vrby jívy jsou doporučeny 4 klony *Salix x smithiana* (S-218, S-206, S-417 a S-383 selektované ve VÚLHM) a 3 blíže neurčené hybridy *Salix caprea* ze šlechtění lesnické fakulty v Brně (S-704, S-705 a S-706) selektované ve VÚLHM.

Z okruhu vrby košíkářské je doporučeno 5 klonů *Salix viminalis* (S-264 a S-310 ze šlechtitelské stanice Horní Moštěnice, S-337 z novošlechtění VÚLHM, S-519 z LTM Žilina a S-699, všechny selektované ve VÚLHM).

Rovněž jsou doporučeny 3 klony vrby lýkocové (*Salix daphnoides* S-234 a S-077 ze šlechtitelské stanice Horní Moštěnice a S-588 selektovaný ve VÚLHM).

Na pěstování těchto výše uvedenou legislativou schválených klonů rychlerostoucích dřevin jsou vázány dotace poskytované dle Nařízení vlády č. 308/2004 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

Současně pokračuje ve VÚLHM výzkum zaměřený na ověřování dalších klonů s maximální schopností produkce biomasy ve velmi krátkém obmýti a v marginálních zemědělských oblastech.

1.3. Choroby a škůdci topolů a vrb

Důležitým aspektem pěstování topolů je přirozený výskyt širokého spektra škůdců a chorob, které napadají všechny orgány mladých rostlin i starých stromů.

Na listech škodí četné rzi, nejčastěji z rodů *Melampsora* a *Marssonina*. V podmínkách ČR je nejvýznamnější *Melampsora larici-populina*, která může v případě zanedbání pěstební péče způsobit ztráty na produkci sazenic ve školkách. Napadení rzí se projevuje výskytem oranžových letních výtrusů na spodní straně listů, koncem léta listy nekrotizují a předčasně opadávají. Pokud jsou rzi ve školce zjištěny, je nutné aplikovat fungicidy, např. Novozir MN 80, Dithane M-45, Kuprikol ve 14denním intervalu. Preventivním opatřením je např. vytvoření ochranného pásma bez mezipřímých druhů, především modřínu opadavého, v bezprostřední blízkosti školky.

Nejzahušněnější chorobou topolů je dotichíza topolová (*Chondroplea populea*), která se projevuje vodnatým ztmavnutím kůry, následným vznikem prohlubujících se trhlin v kůře a jejich zavalováním. V místech větvení je na kmínku mladých rostlin patrné hnědnutí pod kůrou. Ochranu rostlin před napadením dotichízou je nutno provádět preventivně, fungicidním postřikem (Novozir MN 80) na jaře 3 – 4 týdny před začátkem rašení, na podzim poprvé v polovině října a podruhé po opadu listů.

V topolových školkách je nejdůležitější zabránit vzniku abiotického stresu rostlin, a to jak volbou vhodného stanoviště, tak správnou péčí o výživu a pravidelnou závlahu rostlin. K houbovým chorobám jsou vždy vnímavější primárně oslabené rostliny se sníženou vitalitou.

Topolové porosty je třeba zakládat v takových stanovištních podmínkách, pro které byly jednotlivé klony testovány a doporučeny. Nejvhodnější je vysazování směsí několika klonů. Dalším

preventivním opatřením k udržení dobrého zdravotního stavu porostu je důsledné provádění včasných probírek a odstraňování zbytků po těžbě. Nastanou-li příznivé klimatické podmínky pro šíření dotichízy, pak zdrojem infekce jsou právě zbytky dřeva, přestárlé nebo suché stromy ponechané v porostech.

Z virových chorob je nejčastější mozaika topolů a z bakteriálních hnědý mízotok a *Erwinia cancerogena* (odlupčivost kůry).

Nejběžnějším hmyzím škůdcem topolů na listech je mandelinka topolová (*Chrysomela populi*) a zobonoska topolová (*Byctiscus populi*). Kmeny topolů poškozují hmyz napadající dřevo, zejména kozlíček topolový (*Saperda carcharias*), krytonosec olšový (*Cryptorrhynchus lapathi*) a nesytkva ovádová (*Paranthrene tabaniformis*).

Rovněž pěstování vrb ve větším rozsahu je spojeno s rizikem snadného šíření hmyzích škůdců. Zdřevnatělé části rostlin napadá krytonosec olšový (*Cryptorrhynchus lapathi*), kozlíček vrbový (*Lamia textor*), proutí poškozují pilatky a pěnodějky, listy pak mandelinky a také pilatky. Vrby však nejsou ohrožovány houbovými chorobami tak jako topoly.

2. Reprodukční materiál topolů a vrb

V prevenci možných rizik a neúspěchů při pěstování topolů a vrb má důležité místo také kvalita sadebního materiálu. Vnější kvalita řízků a sazenic je popsána od roku 2004 v prováděcí vyhlášce č. 29/2004 Sb. k zákonu č. 149/2003 Sb. o obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Parametry sadebního materiálu topolů jsou stanoveny na základě dlouhodobého hodnocení vlivu kvality sazenic na ujmavost po výsadbě a na další vývoj porostu a konečnou produkci.

Pěstování topolových sazenic má svá specifická pravidla odlišná od pěstování jiných dřevin. Nejběžnější je získávání sazenic výsadbou dřevitých osních řízků. Řízek má mít minimální délku 20 cm a minimální tloušťku na horním konci 8 mm; tímto požadavkem je zajištěno, aby na řízku byly minimálně dva dobře vyvinuté pupeny. Pro účely obchodování nesmí řízky vykazovat příznaky vyschnutí, hniloby, nekrózy, poškození hmyzem nebo houbovými chorobami a jejich dřevo nesmí být starší než dvouleté. Nejvhodnější je v praxi používat pouze řízky z jednoletých prýtů. Při nákupu řízků je vhodné zjistit u dodavatele, v jakých podmínkách a jak dlouho byly řízky skladovány. Fyziologická kvalita řízků se zachovává při skladování v prostorách s trvale vysokou vzdušnou vlhkostí a teplotou do 4°C. Neméně důležitý je také způsob přepravy řízků, kdy se nesmí snižovat vlhkost řízků a nesmí být poškozeny pupeny.

Řízky se vysazují ve školce do dobře připravené půdy zapichováním téměř celou svou délkou kolmo do půdy. Nad povrchem půdy zůstává jen první pupen. Půda musí být k řízku pevně přitlačena, aby nedocházelo k vysychání. Po výsadbě je samozřejmostí udržovat půdu dostatečně vlhkou a odplevelenou. Spon výsadby závisí do značné míry na způsobu následného obdělávání mechanizací, pro vypěstování sazenic se vysazují řízky ve vzdálenosti 20 - 30 cm od sebe. Jednoleté sazenice by měly dosahovat minimální výšky 150 cm a tloušťky 8 mm ve výšce 50 cm nad zemí. Slabší sazenice by neměly být pro výsadbu používány. Je možné je dopěstovat na dvouleté nebo provést jejich seříznutí v předjaří a vypěstovat kvalitní sazenice (t 1 + 2) s dvouletou podzemní a jednoletou nadzemní částí.

Uvedenou metodou jsou pěstovány sazenice všech hybridních topolových klonů a topolu černého. Sazenice bílých topolů jsou pěstovány obvykle generativně výsevem semen pod fólii jako prostokořenné nebo obalované, takže požadavky na jejich parametry se liší od parametrů řízků. Jednoletý semenáč by měl mít výšku 60 - 100 cm při tloušťce krčku 6 - 8 mm.

Sadební materiál vrb je získáván opět z dřevitých řízků, jejichž kvalita by měla být obdobná jako u topolů, i když pro účely obchodování dle zákona č. 149/2003 Sb. není stanovena.

Vedle nezbytné vnější kvality je důležité také dodržování identity a pravosti původu klonového reprodukčního materiálu. Odběratel reprodukčního materiálu si může u dodavatele vyžádat k potvrzení o původu reprodukčního materiálu, který odebírá, také kopii potvrzení o původu reprodukčního materiálu, z něhož byly nakupované řízky nebo sazenice vypěstovány. Dbát na věrohodnost deklarované identity klonů je z mnoha výše uvedených důvodů v zájmu každého

vlastníka půdy bez ohledu na to, zda se jedná o půdu lesní nebo zemědělskou (na niž se zákon č. 149/2003 Sb. nevztahuje). Je to i v zájmu dodavatele, pokud si chce udržet své dobré jméno. V současné době jsou v ČR nabízeny klony topolů a vrb z nejrůznějších zdrojů, stejně jako řízků a sazenice různé kvality.

V souladu s platnou legislativou byly k 1.1. 2004 uznány 2 kmenové matečnice jako zdroj produkce řízků nebo sazenic, které byly založeny reprodukcí klonů z centrální matečnice ve VULHM. Posledním stupněm reprodukce by měla být provozní matečnice sloužící pouze k produkci sazenic (řízků) pro konečného spotřebitele neboli pro výsadbu na místo určení. Je to osvědčený model, který umožňuje minimalizovat možnosti chyb v evidenci klonů při pohybu mezi dodavateli a odběrateli. Existuje totiž jen velmi malá pravděpodobnost, že vizuální kontrolou řízků bude odhaleno nesprávné označení klonu. Obchodování s reprodukčním materiálem rychlerostoucích dřevin pro výsadby na zemědělské půdě není upraveno zákonem, ale dodavatelé podléhají registraci Státní rostlinolékařské správy.

3. Typy kultur pro pěstování rychlerostoucích dřevin

Hospodářské využití geneticky podmíněných vynikajících růstových vlastností rychlerostoucích dřevin je omezeno dobou trvání té růstové fáze života dřeviny, kdy dosahuje vysokého růstového výkonu při dobrém zdravotním stavu. V zájmu pěstitele je proto zvolit pěstební cíl – cílový sortiment a pak pěstební technologii včetně skladby reprodukčního materiálu, která umožní daný cíl splnit v čase, který je touto skutečností dán. Každá odchylka od optimálních pěstebních podmínek způsobuje prodloužení doby obmýetí a snížení výnosu.

3.1. Pěstování topolů v krátkém obmýetí 20 - 25 let

Plantáže s krátkým obmýetím, tzv. lignikultury mají některé znaky společné bez rozdílu pěstovaného druhu dřeviny. Jsou zakládány na stanovišti odpovídajícím nárokům dané dřeviny, kvalitní sazenice jsou vysazovány do připravené půdy v širokém sponu a celoplošná kultivace půdy se provádí až 10 let. Topolové lignikultury jsou vysazovány v cílovém sponu 6 x 6 m a větším, od druhého roku se provádí vyvětřování kmene, které v dalších letech pokračuje do výšky 8 – 10 m. Celoplošná kultivace půdy zvyšuje přírůst až o 30%, takže je podstatným faktorem zkrácení obmýetí na 20 let při zachování plnohodnotné produkce. Cílovým produktem jsou především dýhárenské a pilařské výřezy. Zbývající vytěžená hmota je zpracována na paletové přířezy a štěpku.

Princip pěstování topolových lignikultur můžeme vyjádřit jednoduchým vztahem mezi vstupy a výstupy:

zemědělská půda + ověřené klony + dodržování intenzivní pěstební technologie = vysoký výnos v krátkém obmýetí.

Prostřednictvím lignikultur je možné dále zhodnocovat zemědělskou půdu, která není využívána k zemědělské produkci.

V České republice vznikaly donedávna v omezeném rozsahu pouze topolové kultury na lesní půdě. Zde pěstební postup začíná výsadbou sazenic do vrtaných jamek, vyvětřování kmene se provádí do výšky 5 – 8 m, kultivace půdy v meziřadích alespoň 5 let po výsadbě. Obvyklé obmýetí je 25 let, kdy se porostní zásoba pohybuje přibližně v rozmezí 450 – 600 m³/ha (údaj zjištěný pro 25 let věku porostu) při všech nevýhodách daných pěstováním na lesní půdě. Specifickým znakem českých silvikultur je spon po výsadbě 3 x 3 m až 4 x 4 m, který vyžaduje provedení probírky v období, kdy si jednotlivé stromy začínají navzájem konkurovat (nejpozději po 7 letech). Na kvalitních půdách bývá běžným způsobem péče o topolovou kulturu polaření, které je možné přibližně v prvních dvou letech po výsadbě. V meziřadích jsou pěstovány zemědělské plodiny a jejich obdělávání zároveň podporuje v růstu topoly.

V malém měřítku jsou u nás zatím zakládány porosty osiky, jedná se především o rekultivace. Obvyklý spon je 1x1 m nebo 2x1 m. Intenzivní kulturu je nutné vysazovat ve sponu 3x3 m, pro-

vést jednu probírku a vytěžení následuje ve 20 – 30 letech podle kvality stanoviště. Pro získání sadebního materiálu je nejvýhodnější objednávat osivo z kontrolovaného opylování získané z uznaného zdroje reprodukčního materiálu.

3. 2. Pěstování topolů a vrb ve velmi krátkém obmýtí 3 – 6 let

Alternativou zemědělské výroby na nevyužívané zemědělské půdě jsou plantáže rychlerostoucích dřevin pro energetické využití veškeré vypěstované biomasy, která je sklízena ve velmi krátkém obmýtí 3 – 6 let. Mezi uvedenými intenzivními kulturami zaujímají první místo co do intenzity obhospodařování a pěstební technologie je nejbližší postupům, které zemědělci používají při obdělávání zemědělských plodin.

Standardní postup založení plantáže a navazující pěstební technologie obsahuje tyto kroky:

- přípravu pozemku mechanicky (podle místních podmínek i chemicky) tak, aby výsadba řízků byla provedena do čisté půdy
- výsadba ve velmi hustém sponu, vzdálenost mezi řádky musí odpovídat používanému typu mechanizačního prostředku pro kultivaci půdy, vzdálenost rostlin v řádku okolo 0,5 m
- ochrana proti škodám zvěří
- potřeba sadebního materiálu v množství 7 – 10 000 řízků / ha
- pravidelné plečkování do doby než se kultura zapojí a zastiňuje plevel
- přihnojování dusíkatým hnojivem obvykle od druhého roku
- kontrola škůdců (popř. chemická ochrana)
- velmi krátké, cyklické obmýtí po 3 – 6 letech
- obnova plantáže z výmladků na pařezu do věku kultury přibližně 20 let.

Ekonomicky efektivního průměrného výnosu dnes pěstovaných klonů nad 10 t sušiny/ha/rok bylo dosaženo v pokusných plantážích v 3letém obmýtí pouze v klimaticky příznivějších částech ČR. Další výsadby ukazují, že období od výsadby do sklizně plantáže se prodlužuje jak s vyšší nadmořskou výškou, tak s u nás typickým nedostatkem pěstební péče, popř. s nevhodně zvoleným sortimentem sadebního materiálu. Před založením porostu je vhodné zajistit odborné posouzení stanoviště, zvážit veškerá rizika v dané lokalitě a pak si objednat vypracování projektu odborným pracovištěm. Nevhodné jsou půdy mělké, vysychavé, s vyšším podílem skeletu, svažité pozemky. Projektant je odpovědný především za výběr sortimentu podle podmínek stanoviště a popis pěstební technologie tak, aby vlastníkově nevznikaly ztráty, které bylo možné předvídat na základě znalosti problematiky.

Kontakt

Lud'ka Čížková, Vladimír Čížek
Adresa: VÚLHM, 686 04 Kunovice
cizkova@vulhmuh.cz, tel.: 572 420 912
cizek@vulhmuh.cz, tel.: 572 420 913

RÁMCOVÁ TYPOLOGIE ZEMĚDĚLSKÝCH půd pro pěstování vybraných klonů topolů a vrb k energetickému využití v České republice

Ing. Jan Weger, Ph.D. a kol.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i.

Shrnutí

Příspěvek pojednává o rámcové typologii zemědělských půd (stanovišť) pro pěstování vybraných klonů topolů a vrb k energetickému využití v České republice, která je vytvářena na našem pracovišti pro potřeby projektantů a praktických pěstitelů jako součást pěstební rajonizace nejperspektivnějších klonů topolů a vrb. Pro vytvoření rámcové typologie zemědělských půd byly využívány dva podklady: výsledky testování tzv. doporučeného sortimentu klonů topolů a vrb na výzkumných plochách a produkčních porostech a dále bonitace zemědělských půd v soustavě BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek). Výsledkem vícestupňové analýzy bylo vytvoření 6 skupin půd resp. stanovišť dle vhodnosti pro pěstování klonů tzv. doporučeného sortimentu RRD. I s ohledem na skutečnost, že životnost výmladkových plantáží je delší než věk nejstarších pokusných a produkčních porostů u nás, je rajonizace klonů i typologie půd průběžně zpřesňována na základě výsledků výzkumu a provozní praxe.

Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) – v našich podmínkách vybrané odrůdy a klony vrb a topolů – pěstované ve výmladkových plantážích (anglicky: short rotation coppice - SRC) na zemědělské půdě jsou jednou z perspektivních a již i komerčně pěstovaných energetických plodin v Evropě. Základní prvky koncepce pěstování výmladkových plantáží byly vytvářeny v Severním Irsku, Anglii a Švédsku již v průběhu 70. a 80. let minulého století jako alternativní způsob zemědělského hospodaření s odbytem pro papírenský a energetický průmysl.

Ze současné rozlohy okolo 20 000 ha vrbových plantáží se ročně sklízí asi 4000 ha převážně ve středním a jižním Švédsku a Velké Británii. Štěpka z plantáží je zde pro svoji homogenitu i dostupnou cenu žádaným biopalivem v obecních teplárnách a velkých elektrárnách. Rozloha vrbových plantáží narůstá také v Polsku, Dánsku a Baltských zemích. Topolové výmladkové plantáže se pěstují asi na 5000 ha hlavně ve střední a jižní Evropě, nejvíce pak v Rakousku (cca 1000 ha) a severní Itálii (cca 2000 ha včetně poloprovozních plantáží). V těchto i mnoha dalších zemích rozloha topolových výmladkových plantáží postupně narůstá vlivem příznivých ekonomických a dotačních podmínek, které jsou často podporovány regionálními samosprávami, agrárními komorami nebo podnikatelskými skupinami.

V ČR byla první výmladková plantáž založena v roce 1994 a doposud bylo vysazeno přes 220 ha výmladkových plantáží a 25 ha matečnic (pro produkci sadebního materiálu), což je nejméně ze všech okolních zemí. V České republice je dnes okolo 230 ha převážně topolových výmladkových plantáží a okolo 20 ha matečnic. Česká republika má podle našeho názoru poměrně vhodné podmínky pro pěstování topolů i vrb i když zatím dosti převažuje pěstování jednoho klonu topolů (Max-4 resp. J-105). Podle stávající energetické politiky (SEP, 2003) by se výmladkové plantáže měly pěstovat do roku 2030 cca na rozloze 60tis ha.



Obr.1: Pátá sklizeň nejstarší výmladkové plantáže v ČR v věku 14 let.

Sortiment vrby a topolů pro výmladkové plantáže

Pro výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin (**RRD**) se v podmínkách mírného klimatického pásma používají téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrby a topolů. Další druhy dřevin testované u nás nebo v podobných přírodních podmínkách (např. olše, akát, pajasan, líska aj.) se zatím do praxe neprosadily, případně existují bariéry pro jejich využití. Pro značně proměnlivé půdně klimatické podmínky České republiky není možno přednostně doporučit jen klony/odrůdy topolů nebo jen vrby, jak je tomu v některých zemích či regionech Evropy. Například v severní Evropě se pěstují téměř výhradně vrby a topoly v Evropě jižní. Výběr klonu či odrůdy také ovlivňují další faktory jako např. požadovaný cílový produkt, pěstební a sklizňová mechanizace, dostupnost a vlastnická práva odrůd. Všechny klony a odrůdy topolů a vrby určené pro pěstování na zemědělské půdě a je možno je množit a prodávat při dodržení podmínek daných zákonem o nakládání se sadbou a osivy č. 219/2002 Sb. Fakticky jsou dnes u nás dostupné následující zdroje sadby:

- **„Schválené a doporučené klony vrby a topolů“***) MŽP a MZe. Jedná se o druhy a klony vybrané z domácích sbírek (testování VÚKOZ od roku 1994) a povolené pro pěstování v krajině. Klony nejsou chráněné šlechtitelskými právy a je s nimi založeno 98% českých plantáží.
- **„Švédské vrby“**: Jedná se o registrované odrůdy ('Tora', 'Inger', 'Tordis' a další) vyšlechtěné záměrným křížením převážně z druhu *S. viminalis*, ale i jiných druhů keřovitých vrby. Odrůdy jsou chráněné šlechtitelskými právy. V ČR jsou vysazeny asi 3 ha.
- **„Italské topoly“**: Jedná se o registrované odrůdy ('AF2', 'AF1', 'Sirio', 'Monviso' aj.) převážně ze skupiny tzv. kanadských topolů (*P. × canadensis*) získané záměrným křížením v italských firmách a ústavech zaměřených na problematiku pěstování topolů. Odrůdy jsou chráněné šlechtitelskými právy a v ČR se pěstují v pokusných a poloprodučních porostech.

*) „Přehled klonů rychle rostoucích dřevin schválených MŽP pro zakládání výmladkových plantáží pro energetické využití“ byl poprvé vytvořen v roce 1999. Důvodem byla nutnost posouzení druhů a klonů RRD potenciálně vhodných pro výmladkové plantáže dle podmínek zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb - zejména z hledisek jejich (ne)původnosti a rizik invazního šíření v krajině. Seznam klonů byl naposledy aktualizován na základě zadání MŽP v roce 2008 a jeho aktuální verze ["Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny"](#) je umístěn na stránkách oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i.

Rámcová typologie zemědělských půd je zpracovávána pro sortiment tzv. schválených a doporučených klonů RRD zveřejněný ve Věstníku MZe č. 1/2004. Seznam obsahuje 25 klonů vrb a 19 klonů topolů, které byly posouzeny a schváleny z hlediska rizik pro pěstování v krajině dle zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/ 1992 Sb., § 5). Podle výsledků polního testování má pro výmladkové pěstování dobré výnosové a růstové vlastnosti 9 klonů topolů a 11 klonů vrb. Další klony z doporučeného seznamu jsou vhodné do opláštění a rozčlenění produkčních porostů nebo se pro výmladkové pěstování neosvědčily.


Faktory ovlivňující výnos výmladkových plantáží

Výsledky testování dřevin pro výmladkové plantáže v ČR prováděné na VÚKOZ, v.v.i. od roku 1995 ukazují, že nejdůležitějším předpokladem pro dosažení dobrých výnosů je volba vhodného stanoviště, které je dáno kombinací půdních a klimatických podmínek. Zejména se jedná o dostupnost vody (půdní a srážkové), fyzikální vlastnosti půdy a další limitující faktory zejm. klimatické (výskyt přísušků aj.).

Výběr vhodných klonů a odrůd RRD pro konkrétní výsadbu případně region musí tedy vycházet v první řadě ze znalosti půdně-klimatických (stanovištních) podmínek zvolené lokality. K výběru vhodných stanovišť je možno použít rámcovou typologii a rajonizaci doporučených klonů RRD zpracovanou na VÚKOZ a publikovanou například v Lesnické práci VI/2007. Pokud je zvolené stanoviště - zemědělský pozemek - pro topoly a vrby vhodný, je možno vybrat nejvhodnější klony příp. odrůdy na základě jejich specifických vlastností a nároků.

Typologie zemědělských půd pro vrby a topoly

Pro vytvoření rámcové typologie zemědělských půd byly využívány v zásadě dva podklady: výsledky testování tzv. doporučeného sortimentu klonů topolů a vrb na výzkumných plochách a produkčních porostech a dále bonitace zemědělských půd v soustavě BPEJ – bonitovaných půdně ekologických jednotek (Kolektiv, 1990).



Bonitovaná půdně ekologická jednotka zemědělských pozemků vyjadřuje pětímístným číselným kódem (např. 2.11.14 nebo 21114) hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy. Kombinací prvních 3 čísel vzniká tzv. hlavní půdně klimatická jednotka (HPKJ), která byla použita jako základ pro typologii stanovišť. Při analýze bylo hodnoceno 525 HPKJ, které jsou relevantní pro pěstování současného doporučeného sortimentu RRD. Jako hodnotící parametry vhodnosti HPKJ byly použity charakteristiky klimatických regionů (srážky, suma teplot) a hlavních

půdních jednotek (půdní vláha, vysychavost), které byly vztahovány výsledkům hodnocení růstu a výnosů klonů vrb a topolů. Výsledkem vícestupňové analýzy bylo vytvoření 6 skupin půd (HPKJ) dle vhodnosti pro pěstování klonů ze schváleného a doporučeného sortimentu RRD (viz legenda k Tab1.). Uvedený postup byl úspěšně ověřen a využit pro vymezení pěstebních oblastí topolů pro sadovnické a krajinářské účely (Mottl, Dušek, 1991).

I s ohledem na skutečnost, že předpokládaná životnost výmladkových plantáží je delší než věk nejstarších pokusných a produkčních porostů u nás, je rajonizace klonů i typologie půd průběžně zpřesňována na základě výsledků výzkumu a provozní praxe. Aktualizace prezentované rámcové typologie v současnosti probíhá v rámci projektu MŽP. Na základě literárních podkladů a konzultací s experty VÚMOP dochází k úpravám skupin HPJ s podobnými pěstebními podmínkami pro vybrané klony topolů a vrb. Zejména se jedná o zpřesnění nevhodných půd např. vysychavých (4, 5, 21, 22, 27, 31-41) a zpřesnění rozdílů v rozsáhlé skupině hydromorfických ne vodou silně ovlivněných půd (HPJ 42-76). Výsledky aktualizace budou publikovány po obhájení výzkumné zprávy projektu.

Tab. 1: Tabulka rámcové typologie zemědělských půd (stanovišť) pro pěstování vybraných klonů RRD z tzv. doporučeného sortimentu v systému hlavních půdních jednotek (HPKJ).

HPJ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
KR	0																																											
	1																																											
	2																																											
	3																																											
	4																																											
	5																																											
	6																																											
	7																																											
	8																																											
	9																																											

HPJ	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78							
KR	0																																											
	1																																											
	2																																											
	3																																											
	4																																											
	5																																											
	6																																											
	7																																											
	8																																											
	9																																											

Oblast/stanoviště (Výnosová křivka)	Označení v tabulce	Očekáv. výnos tun(suš.)/ha/rok Ø Min Max	Popis stanovištních podmínek v oblasti
Nepříznivá A [Le++]		<2 0 3	Stanoviště nevhodná pro současný doporučený sortiment RRD převážně z důvodu nepříznivosti klimatických podmínek (průměrná teplota, suma teplot, mrazy) a nebo extrémních půdně-oroграфických podmínek (např. svahitost)
Nepříznivá B [Le+]		<3 0 4	Stanoviště převážně nevhodná pro současný sortiment RRD zejména z důvodu nedostatku půdní vláhy nebo/a srážkové nedostatečnosti
Podprůměrná [Le]		5,5 4 6,5	Stanoviště průměrně vhodná pro současný doporučený sortiment RRD – tzn. že půdní a srážkový režimy jsou pro pěstování příznivé, případně jeden ze stanovištních parametrů vyrovnává nedostek druhého
Průměrná [Le+]		7,2 6 8,5	Stanoviště nadprůměrně vhodná – stanovištní podmínky (zejména půdní a srážkový režimy) jsou pro pěstování RRD příznivé a hlavní růstové faktory nejsou ve výrazném nedostatku
Nadprůměrná [Le++]		10,0 8 12	Stanoviště velmi příznivá – stanovištní podmínky (zejména půdní a srážkový režimy) jsou pro pěstování RRD velmi příznivé
Optimální [Lept]		12,0 11 14	Stanoviště optimální – stanovištní podmínky jsou optimální pro pěstování RRD a dosažení maximálního výnosu

Předpokládá se hnojení jen po sklizních

Vliv dalších charakteristik české bonitace zemědělských půd – zejm. sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdy a expozice (4-5 číslo BPEJ) – je posuzován jako dodatečný faktor k výše uvedenému hodnocení HPKJ podle jejich vlivu na výnos RRD a na volbu použitelné pěstební technologie (např. pouze vícefázová sklizeň na prudkých svazích).

Výnosový potenciál výmladkových plantáží

Dalším naším krokem bylo posouzení výnosového potenciálu výmladkových plantáží v 6ti výše uvedených kategoriích HPKJ. K analýze byly využity výsledky hodnocení výnosu klonů na pokusných plochách v různých lokalitách ČR za 2 až 3 sklizně (v několika případech i více). Pro odhad vývoje produkčních charakteristik klonů v pozdějších letech (po 12. roce) byly využity zahraniční výsledky testování a pěstování klonů RRD výmladkovým způsobem. Výsledek potenciálního (očekávaného) výnosu výmladkových plantáží RRD je uveden v Grafu 1. Výnos je vyjádřen v tunách suché hmoty za rok (t [suš.]/ha/rok). V kontextu rajonizace klonů RRD slouží uvedený graf k zhodnocení produkčního potenciálu stanoviště a jeho průběhu v čase, který má vliv zejména na ekonomiku pěstování. Pro získání představy o potenciálním výnosu surové biomasy při sklizni v obvyklém obmýti (3 roky) je potřeba hodnoty odečtené z křivek násobit přibližně dvěma, neboť průměrný obsah vody v čerstvě sklizené biomase se pohybuje v rozmezí 48–55 % (průměr za období 1999–2005 je 53 %).

Závěr

Na základě výsledků dlouhodobých polních pokusů a bonitace zemědělských půd byla vytvořena rámcová typologie zemědělských půd pro pěstování vybraného sortimentu topolů a vrb.

Při využívání typologické tabulky a grafu potenciálních výnosů v projekční a pěstitelské praxi je potřeba vzít v úvahu, že byly vypracovány pro celý sortiment tzv. doporučených klonů RRD

(kromě topolů černých). Pro dosažení optimálních výnosů na vybrané lokalitě je nutno vybrat odpovídající vhodné klony na základě popisu jejich stanovištních nároků, které jsou uvedeny v popisu jednotlivých klonů ve Věstníku MZe (č.1/2004) nebo v publikacích VÚKOZ.

Tab.2: Klony vrb a topolů z tzv. doporučeného sortimentu (Věstník MZe č. 1/2004) a nejlépe hodnocené v polním testování VÚKOZ.

Číslo ve Věstníku	Taxonomické zařazení	Hodnocení
TOPOLY		
J-105	<i>P. nigra</i> L. × <i>P. maximowiczii</i> Henry Jap-105 = 'Maxvier' = Max-4	A
P-494	<i>P. maximowiczii</i> Henry × <i>P. × berolinensis</i> 'Oxford'	A
P-468	<i>P. trichocarpa</i> Torr. et Gray × <i>P. koreana</i> Rehd.	B
P-473	<i>P. deltoides</i> Marsh × <i>P. koreana</i> Rehd. cf. (pův. <i>P. trichocarpa</i> × <i>koreana</i>)	B
P-410, P-412	<i>P. nigra</i> L. × <i>P. simonii</i> Carr. CZ-2354/5	C
P-VUKOZ-1 až 8	<i>P. nigra</i> L.	B, D
VRBY		
S-195	<i>S. × rubens</i> Schr.	A
S-469	<i>S. alba</i> L.	A
S-117	<i>S. alba</i> L.	A, D
S-218	<i>S. × smithiana</i> Willd.	A, D
S-337	<i>S. viminalis</i> L.	A, D
S-704	<i>S. caprea</i> × wind	B
S-639	<i>S. alba</i> L. 'Carrone-51'	B
S-519	<i>S. viminalis</i> L.	B
S-383	<i>S. × smithiana</i> Willd.	B, D
S-310	<i>S. viminalis</i> L.	B, D


Legenda hodnocení klonů:

A - klony s vynikajícím výnosovým potenciálem (9-12 t[suš.]/ha/rok) na příznivých půdách (stanovištích).

B - klony s velmi dobrým výnosovým potenciálem (7-8 t[suš.]/ha/rok) na příznivých půdách (stanovištích).

C - klony s dobrým výnos. potenciálem (4-6 t[suš.]/ha/rok) na sušších stanovištích při životnosti porostu do 15 let).

D - klony domácích druhů (možno pěstovat v zvláště chráněných územích)



Graf. 1: Výnosový potenciál výmladkových plantáží RRD podle příznivosti stanoviště (skupin HPKJ).

Použitá a doplňující literatura

- HAVLÍČKOVÁ K., KNÁPEK V., VAŠÍČEK J., WEGER J. (2005): Biomasa jako obnovitelný zdroj energie, ekonomické a energetické aspekty. – Acta Průhoniciana 79: 1–67.
- HAVLÍČKOVÁ K., WEGER J. a kol. (2006): Metodika analýzy biomasy jako obnovitelného zdroje energie. – Acta Průhoniciana 83: 1–96.
- Kolektiv (1990): Bonitace československých půd a směry jejich a směry jejich využití, 5. díl Stanovení úředních cen zemědělské půdy. – 85 p., MZe ČR, Praha.
- MAŠÁT K. a kol. (2002): Metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek. – 113 s., VÚMOP Praha.
- MOTTL J., DUŠEK J. (1991): Vymezení pěstebních oblastí topolů pro sadovnické a krajinářské účely. – 140 s., ZZ 295, VŠÚOZ, Průhonice.
- Věstník MZe (2004): Přehled dřevin pro výsadbu porostů rychle rostoucích dřevin, popřípadě jejich klonů pro rok 2004 a následující – č.1/2004, částka 1, pp. 44–46, vydáno 3.5.2004
- WEGER J., VLASÁK P., ZÁNOVÁ I., HAVLÍČKOVÁ K. (2006): Výnos a růst vybraných klonů rychle rostoucích dřevin ve druhém obmýtí – pp. 46–56, Sborník referátů konference „Energetické a průmyslové plodiny“, VÚRV Praha, Chomutov. ISBN 80-86555-88-7
- WEGER, J. (2008): Výnos vybraných klonů vrb a topolů po 9 letech výmladkového pěstování – Acta Pruhoniciana 89: 5–10.
- WEGER, J. a kol. (2007): Rámcová typologie zemědělských půd pro pěstování vybraných klonů topolů a vrb k energetickému využití v České republice – Lesnická práce č. 04/07, Praha
- WEGER, J., HAVLÍČKOVÁ, K. a kol. (2003): Biomasa obnovitelný zdroj energie v krajině - 51 p., VÚKOZ, Průhonice.

Poděkování

Prezentované výsledky vznikly zejména za podpory výzkumného záměru VÚKOZ, v.v.i.

Kontakt

Ing. Jan Weger, Ph.D. a kol.
VÚKOZ, v.v.i., 252 43 Průhonice
e-mail: weger@vukoz.cz

ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM RRD U LČR s.p. HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Josef Miškovský
Lesy České republiky, s.p.

Úvod

Na jaře roku 2006 se Lesy České republiky, s.p. (LČR) po konzultacích s MZe ČR rozhodly zahájit projekt biomasa. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že biomasa je jedním ze zdrojů obnovitelné energie (OZE) a Česká republika se zavázala v rámci Evropské unie ke krytí určitého procenta hrubé domácí spotřeby energie její výrobou z OZE. Indikativní cíl pro ČR byl stanoven na 8 % v roce 2010. Dalším dlouhodobějším cílem je závazek ČR 13% v roce 2020. V tomto údaji je zahrnuta i výroba tepla z OZE. V rámci projektu biomasa se LČR rozhodly pěstovat rychle rostoucí dřeviny na zemědělské půdě určené pro energetické využití (RRD) a od začátku roku 2007 též systematicky využívat zbytky po těžbě k energetickým účelům.

Dalším důvodem pro zahájení projektu u LČR byla skutečnost, že začátkem roku 2006 byl v ČR nadbytek potravinářských komodit a pěstování RRD je jednou z možností nepotravinářského využívání zemědělské půdy. V té době se pěstování RRD přes významnou podporu založení porostů mezi zemědělci nerozšířilo. Proto LČR měly rovněž zjistit příčiny, které k tomu vedly a ve spolupráci s MZe je odstranit. Rozhodnutí pěstovat RRD u LČR bylo též reakcí na Akční plán pro biomasu přijatý Radou EU na jaře roku 2006, který motivuje členské země k podpoře produkce biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Zakládání porostů RRD

Jako RRD se v České republice převážně používají vyšlechtěné klony topolů a vrb, které se pěstují na stanovišti zhruba 20 let a sklízí se v tří až pětiletých intervalech. Produktem sklizně RRD je štěpka, která se spaluje při výrobě tepla a energie. Novým trendem je využívání biomasy její fermentací či gasifikací pro výrobu biopaliv druhé generace.

LČR předpokládaly využít pro výsadbu plantáží RRD zemědělské pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR (PF ČR), které je možné podle zákona převádět do práva hospodařit státním organizacím to je i LČR. PF ČR však na tuto alternativu nepřistoupil, proto LČR začaly pěstovat RRD na pozemcích vlastních a pronajatých.

Pro přípravu a počáteční realizaci projektu LČR dohodly odbornou spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumnou stanicí Uherské Hradiště. Realizací projektu byl pověřen Lesní závod Židlochovice.

Protože klony topolů a vrb vyžadují pro zdárný růst dostatečnou zásobu vody v celém vegetačním období byly pro výsadbu RRD vybírány pozemky zamokřené nebo občasné zaplavované rozlivem povodňových vod. Takové pozemky jsou obtížně zemědělsky využitelné, ale pro pěstování RRD velmi vhodné. Často bývají zarostlé rákosem a proto jejich příprava k výsadbě řízků je technicky i finančně náročná.

Tabulka č. 1: Použité klony dřevin

Druh dřeviny	Klon
Topol	
Populus nigra x maximowiczii	Max 4 + Max 5
Populus maximowiczii x berolinensis	Oxford
Vrba	
Salix x smithiana	S – 218
Salix x smithiana	S – 417
Salix alba	S – 639
Salix x rubens	S – 195
Salix viminalis	S – 519

Tabulka č. 2: Výsadby v letech 2007 - 2008

Lokalita	Rok výsadby	Plocha v ha	Umístění
Pohořelice	2007	2,99	V blízkosti řeky Jihlavy
Přímětice	2007	4,78	V sousedství potoka
Ivaň (matečnice)	2007	2,00	U soutoku řek Dyje a Jihlavy
Přítluky	2008	14,38	V blízkosti řeky Dyje
Velký Dvůr	2008	14,19	V blízkosti řeky Jihlavy
Krnov	2009	3,90	U řeky Opavice
Celkem		42,24	

Podpora pěstování RRD v ČR

Rada EU schválila v květnu 2006 Akční plán pro biomasu, kde mimo jiné doporučuje podporovat vytvoření dobře fungujícího transparentního a otevřeného trhu s biomasou a zvýšené využívání biomasy pro účely vytápění zejména při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V dokumentu Rada vyzývá členské státy, aby vytvořily příznivé regulační prostředí pro investování do produkce biomasy a zajistily investorům středně a dlouhodobou stabilitu a transparentnost.

V ČR bylo do roku 2006 pěstování RRD v rámci HRDP podporováno 60.000,- Kč/ha na založení porostu při splnění podmínky dané nařízením vlády č. 308/2004 Sb. dočasně vyjmout plochy plantáží RRD ze zemědělského půdního fondu (ZPF) nejméně na 15 let. Naopak základní zemědělskou dotací v dotačním systému EU je u nových členských států jednotná platba na plochu tzv. SAPS, která se však poskytuje na zemědělskou půdu evidovanou v registru zemědělské půdy tzv. LPIS. I při dočasném vynětí půdy ze ZPF se nárok na dotaci ztrácel.

Velmi záhy tak bylo jasné proč zemědělci nemají zájem o pěstování RRD. Tato pro ně navíc nová činnost jim přinášela ztrátu základní dotace SAPS na 15 let. Podpora založení porostů RRD ji nemohla nahradit. K tomu navíc přistupovala nejistota s cenou štěpky v době budoucích sklizní.

Proto se LČR zaměřily na odstranění povinnosti dočasného vynětí plantáží RRD ze ZPF a tím umožnění získání SAPS. Současně se snažily dosáhnout výkladem předpisů oprávněnost RRD pro SAPS.

Koncem roku 2006 došlo k zásadnímu obratu. Při jednání Řídícího výboru pro přímé platby 18.10. 2006 v Bruselu poukázalo Polsko na tento problém a požádalo, aby počínaje rokem 2007 byla kategorie RRD oprávněna pro platbu SAPS. LČR dopisem generálního ředitele požádaly ministryni zemědělství, aby podpořila požadavek Polska při projednávání navržené změny. Tak se koncem roku 2006 RRD staly oprávněné pro SAPS. V té době se také nové členské státy EU zapojily do získávání podpor pro energetické plodiny (uhlíkový kredit).

Pro získání podpor z EU však bylo nutné promítnout nová nařízení EU do národních předpisů. Proto LČR iniciovaly v lednu 2007 schůzku zainteresovaných odborů MZe ČR, na které byly dohodnuty potřebné kroky k tomu, aby bylo možné do 15.5.2007 (konečný termín pro řádné podání

žádostí) požádat pro RRD o podporu pro energetické plodiny a SAPS. Dohodnutá opatření byla promítnuta do nařízení vlády, předpisů Státního zemědělského intervenčního fondu a LPIS, takže v první polovině května bylo možno pro RRD o obě podpory požádat. Na jednání bylo též dohodnuto, že o podporu na založení porostů RRD, pro které se teprve připravovalo nařízení vlády do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (PRV), bude možné žádat i pro výsadbu provedenou v roce 2007.

Od 1.3.2007 začala rovněž platit novela prováděcí vyhlášky k zákonu č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, dle které se plantáže RRD mohou pěstovat i na zemědělské půdě, takže se již nemusí dočasně vyjímat ze ZPF.

Z pohledu začátku roku 2007 bylo možno konstatovat, že celková podpora RRD je natolik zajímavá, že se o jejich pěstování začne zemědělská veřejnost zajímat.

V dubnu 2007 však došlo k zásadní změně. Při schvalování Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) v Bruselu byla podpora založení porostů RRD přesunuta z Osy 2 (pro kterou bylo připravováno již zmíněné nařízení vlády) do Osy 1. Zde je úplně jiný systém poskytování podpor. Na rozdíl od Osy 2, kde se podpora poskytuje na hektar, se v Ose 1 poskytuje po předložení projektu procentem z uznaných výdajů. K tomu ovšem musí být v ČR Pravidla, která dosud nejsou zveřejněna. Žádosti se podávají v jednotlivých kolech, které vyhláší ministr zemědělství. Podmínkou k získání podpory je navíc i povinnost žadatele vypěstované RRD energeticky spotřebovat pro vlastní potřebu, a tím je podpora založení porostů RRD pro zemědělce v ČR obtížně využitelná.

Tato podpora je pro zájemce o pěstování RRD zásadní, protože právě zakládání porostů s sebou přináší nejvyšší náklady. Zvláště důležitá je řádná příprava pozemků a udržení bezplevelného stavu v roce výsadby, aby plevel neomezoval řádný růst RRD v počátku vegetace a nákup a výsadba řízků je rovněž nákladnou záležitostí.

Navíc je pěstování RRD v ČR nevyzkoušená činnost pokud se týká dodavatelsko-odběratelských vztahů a cen biomasy v době budoucích sklizní. Dotace založení porostů RRD tak jak byla koncipována snižovala podnikatelské riziko a na druhou stranu zavazovala příjemce dotace řádně pěstovat RRD po dobu nejméně 10 let. Připravované nařízení vlády ČR tento problém uspokojivě řešilo, ale přesunutím podpory do Osy 1 nemohlo být přijato.

Tabulka č. 3: Podpora RRD v ČR

Rok	2006	2007	2008	2009
Založení porostů	60 tis. Kč/ha	0	0	0
SAPS	0	2792 Kč/ha/rok	3072 Kč/ha/rok	3700 Kč/ha/rok odhad
Top-up	0	0	1341 Kč/ha/rok	1350 Kč/ha/rok odhad
Uhlíkový kredit	0	31,5 EUR/ha/rok	45 EUR/ha/rok	Do 45 EUR/ha/rok

Pozn.: podpory SAPS a Top-up jsou od roku 2008 poskytovány na veškerou zemědělskou půdu v ČR, která je evidovaná v LPIS

Akční plán pro biomasu ČR

Akční plán pro biomasu přijatý Radou EU v roce 2006 motivuje členské země k přijetí národních akčních plánů pro biomasu. Proto i Vláda ČR dne 12.1.2009 svým usnesením č. 47 přijala Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011. V tomto Akčním plánu vláda navrhuje jako jednu z aktivit podpořit rozšíření ploch osázených rychle rostoucími dřevinami, ukládá ministru zemědělství přesunout podporu založení porostů RRD v rámci PRV do Osy 2 a podporu vyhlásit nejpozději od 1.1.2010. Tuto změnu musí projednat MZe v Komisi EU. Pro vyjednávání však má silný mandát, kterým usnesení vlády je.

Závěr

Od dubna roku 2007 usilují LČR ve svých vyjádřeních k nařízením vlády a k Akčnímu plánu pro biomasu ČR o návrat podpory na založení porostů RRD v PRV z Osy 1 zpět do Osy 2. Dosud však v ČR na založení porostů RRD žádná dotace není. Také proto se vedení podniku rozhodlo k utlumení tohoto projektu u LČR a v roce 2009 došlo k výsadbě pouhých 3,90 ha RRD v lokalitě, která byla pro výsadbu připravována již v roce 2008.

Z konzultací se zájemci o pěstování RRD z řad zemědělců vyplývá, že do projektů pěstování RRD nejsou schopni vstupovat pouze s vlastními finančními zdroji. Proto je dotace založení porostů v Ose 2 tak důležitá pro další osud pěstování RRD v České republice. Věříme, že MZe ČR využije mandátu, který má od vlády ČR zakotvený v Akčním plánu pro biomasu ČR, vyjedná potřebnou změnu v PRV v Bruselu tak, aby od roku 2010 byly dotace na založení porostů RRD opět v Ose 2 poskytovány.

Kontakt

Ing. Josef Miškovský
Lesy České republiky, s.p.
miskovsky@lesy-cr.cz

ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVIN V MIKROREGIONU BYSTŘICE N. P.

Ing. Miroslav Trnka, CSc.

Zemservis, zkušební stanice Domanínec s.r.o.

Na přelomu tisíciletí, konkrétně v letech 1999 až 2001, byla ve městě Bystřice n. P. zrealizována výstavba kotelny. Stavěna byla se záměrem centrálně vytápět a zásobovat teplou vodou větší část města.

Byly nainstalovány dva kotle, každý o výkonu 4500 kW. Palivem měla být odpadní dřevní štěpka vznikající při těžbě a prvotním zpracování dřeva. V souvislosti s rozvojem i jiných odvětví průmyslu používajících štěpku (nábytkářský průmysl) se v průběhu krátké doby stala z odpadu surovina. To se promítlo jednak v ceně dřevní štěpky a také v dostupnosti uvedeného materiálu. Nebylo zřejmé, že pro nově postavenou kotelnu bude k dispozici dostatek paliva.

Jako jedno z možných řešení vzniklé situace se jevilo záměrné pěstování biomasy. Bylo však nutné se rozhodnout, zda potřebné palivo bude získáno prostřednictvím pěstování energetických bylin nebo pěstováním rychle rostoucích dřevin. S tím souvisela i otázka který druh je pro mikroregion a příslušné lokality vhodnější, kterou odrůdu resp. klon bude v podmínkách mikroregionu Bystřice n. P. nejvhodnější pěstovat. Bylo třeba vyřešit jaký spon tj. počet jedinců na plochu bude nejvhodnější použít pro dosažení maximálních výnosů v mikroregionu Bystřice n. P., jaké jsou z pohledu agrotechniky únosné minimalizační zásahy při zachování požadovaných výnosových parametrů včetně vhodnosti aplikace pesticidů. Jaké výnosy sušiny lze v podmínkách mikroregionu Bystřice n. P. trvale (opakovatelně) dosahovat, jaké mechanizační prostředky lze při množení řízků při pěstování produkčních porostů, sklizni a dalším zušlechťování vypěstované hmoty používat a jaká je jejich dostupnost. Samozřejmě, že při rozpracování každého okruhu otázek nabíhaly dílčí otázky, které bylo nutno zodpovědět resp. vyřešit, aby bylo možno dosáhnout konečného cíle tj. spuštění fungujícího systému pěstování biomasy.

Mikroregion Bystřice n. P. je charakterizován nadmořskou výškou 560 až 600 m, průměrnou roční teplotou 6,4 °C a ročním úhrnem srážek 602 mm. Po odzkoušení vybraných druhů bylin (šťovík, sléz krmný, lesknice) bylo v roce 2001 zahájeno intenzivní zkoušení rychle rostoucích dřevin a to druhů topol (Populus) a vrba (Salix). Byl založen přesný parcelkový pokus, v němž bylo zařazeno 14 klonů topolu a 16 klonů vrby. V pokusu byly respektovány zásady správné pokusnické praxe.

Vybrané výsledky zkoušení RRD z let 2001–2006, stanoviště Domanínec (průměry ze 4 opakování)

Topoly (Populus)

Znak Klon	délka kmene (m)	průměr kmene (cm)	výnos štěpky z 1 ha		sušina	výnos sušiny	
			(t)	(%)	(%)	(t/ha)	(t/ha/rok)
1.JAP 104	11,0	9	203,2	75,8	46,4	94	16
2.JAP 105	11,0	10	268,0	100,0	47,5	127	21
3.P 524	8,9	8	135,6	50,6	51,8	70	12
4.P 473	10,0	10	222,3	82,9	48,5	108	18
5.P 494	8,7	7	232,5	86,7	49,9	116	19
6.STY 6	5,6	6	185,6	69,3	49,9	93	16
7.P Nigra	6,7	7	153,1	57,1	45,5	70	12
8.Generosa	8,3	4	136,7	51,0	55,6	76	13
MD 0,05			29,47	15,3			
MD 0,01			40,12	20,9			

Vrby (Salix)

Znak	délka kmene	průměr kmene	výnos štěpky z 1 ha		sušina	výnos sušiny	
Klon	(m)	(cm)	(t)	(%)	(%)	(t/ha)	(t/ha/rok)
1.S 234	7	5	83,7	50,9	52,1	44	7
2.SDK MN	8,5	6	164,3	100	50,8	83	14
3.Viminalis	7,5	5	155,5	94,6	54,2	84	14
4.S 110 MN	4,3	3	96,6	58,8	54,4	53	9
5.Swim 519	7,8	4	106,4	64,8	54,5	58	10
6.Swim 337	8,9	6	142,3	86,6	52,5	75	12
7.Swim 218	8,7	6	131,1	79,8	52,6	69	11
8.S 417	5,7	4	140,4	85,5	54	76	13
9.S DAPY	5,6	3	160,5	97,9	50,4	81	13
10.S 123	8,4	8	214,3	130,4	48,5	104	17
11.S270	9,6	7	160	97,4	51,1	82	14
12.S237	7,3	5	103,1	62,8	51,6	53	9
13.S 457	6,8	6	93,1	56,7	52,1	49	8
14.S 699	5,3	4	103,7	63,1	51,4	53	9
15.S 310	7,1	5	109,5	66,6	51	56	9
MD 0,05			30,4	18,5			
MD 0,01			40,8	24,7			

Výsledky zkoušek ukázaly, že:

- z důvodů stability dodávek paliva kotelně je vhodnější pěstovat RRD než byliny (šťovík, lesknice, sléz). Je zřejmé, že vhodnější je topol (Populus) než vrba (Salix) i když je možné vrby pěstovat tam, kde se topolům zřejmě nebude dařit (zamokřené lokality) a vrby jsou v těchto podmínkách schopné poskytnout uspokojující výnos.
- Délka obmýetí je v těchto podmínkách 6 lépe 7 vegetačních období (let).
- Z topolů je jednoznačně nejvhodnější v mikroregionu Bystřice n. P. pěstování klonu J105. Ten by měl tvořit základ plantáží (nejméně 70%). Klon J105 lze doplnit klony P473 a P 494.
- Ukázalo se, že na větších plochách je vhodnější sázení do jednoho řádku než do dvouřádků. Vzdálenost mezi rostlinami v řádku by neměla být menší než 60 cm. Šířka mezi řádky se řídí dostupnou mechanizací a měla by být 1,5 až 2,5 m. Přitom je nutné, aby počet jedinců na 1 ha byl 7 až 10 tisíc.
- RRD je bezpodmínečně nutné pěstovat na orné půdě. Nevhodné jsou pozemky na nichž se nehospodář ať už z důvodu kamenitosti, neúnosné svahovitosti atp. Řízky je třeba vysazovat co nejdříve na jaře do řádně předseťově připravené půdy, kterou je bezpodmínečně nutné v prvních letech důsledně odplevelovat. Minimalizační způsoby jako např. vysazování do nepřipravené půdy nebo neodplevelování během prvních let je naprosto nevhodné. Použití pesticidů resp. herbicidů je možné podle Seznamu registrovaných přípravků. V současné době připadají v úvahu zejména totální herbicidy jako je Roundup nebo Gramoxone při jejich speciální aplikaci (např. knotově). Pěstování topolů bez důsledného odplevelování je nevhodné.
- Výnos sušiny v mikroregionu Bystřice n. P. by se měl pohybovat na úrovni 120 t z 1 ha.
- Při důsledné péči o plantáže případně přihnojením topolů lze dosáhnout výnosů i výrazně vyšších.
- Pro ošetřování porostů za vegetace lze použít běžných kypřících strojů stejně jako mulčovačů, případně sekaček. Před založením plantáže je však nutné uspořádat porost s ohledem na záběr jednotlivých strojů. Pro fázi sklizně nebyly ověřeny stroje na přímou sklizeň,

protože tyto stroje nejsou v ČR běžně dostupné. Je však ověřeno, že v plantážích je možné sklízet celkem efektivně při použití motorové pily a mobilního štěpkovače, kterých je k dispozici řada typů.

Závěrem lze konstatovat, že firma Zemservis pro město Bystřice n. P. připravila a prakticky prověřila pěstební postupy, od produkce řízků až po vypěstování a sklizeň RRD a je připravena k zakládání ploch RRD velkovýrobně.

Kontakt

Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Zemservis, zkušební stanice Domanínek s.r.o.

PRAVOMOCI ÚŘEDNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY při schvalovacích řízeních pro pěstování rychlerostoucích dřevin

Ing. Jana Svobodová

KÚ Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Seznam dotčených zákonů:

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

183/2006 Sb., stavební zákon

449/2003 Sb., o myslivosti

334/1992 Sb., katastrální zákon

252/1997 Sb., o zemědělství

Při schvalovacích řízeních pro pěstování rychlerostoucích dřevin (dále jen RRD) je zásadní otázkou, na jakém druhu pozemku žadatel chce pěstovat RRD a jak je tento pozemek evidován v době, kdy žadatel projeví vůli je zde pěstovat. Dříve bylo možno pěstovat RRD dřeviny pro energetické účely pouze na druzích pozemků „ostatní plocha“ a „les“. Ode dne 1.3.2007, kdy je v účinnosti vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, kterou se provádí zákon č. 334/1992 Sb., katastrální zákon, již není třeba pozemky ze zemědělského fondu vyjímat dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. V tomto bodu se cesta zájemců o pěstování RRD rozděluje na základě druhu pozemků, na kterých má být plantáž RRD založena.

Rozebereme následující případy:

1. pozemek je a i nadále zůstane ostatní plochou
2. pozemek je PUPFL (pozemek určený k plnění funkcí lesa) a i nadále zůstane
3. pozemek je ZPF (zemědělský půdní fond) a i nadále zůstane
4. žadatel požaduje změnu druhu pozemku

V prvních třech případech není třeba rozhodnutí o změně využití území. Ve čtvrtém je toto rozhodnutí nutné. Podkladem k rozhodnutí o změně využití území je pak vyjádření příslušného odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se daný pozemek nachází a územní plán obce, v jejímž katastrálním území se tento pozemek nachází. Stavební úřady jsou při svém rozhodování vázány na umožnění této změny dle schváleného územního plánu a v případě, že se jedná o ZPF nebo PUPFL, souhlasem a následným vynětím tohoto pozemku.

Dalším problémem, na který může žadatel narazit je nutnost zaplacení pozemku proti zvěři, pro kterou jsou sazenice RRD vítaným zpestřením potravy. I když se v případě oplocení plantáže RRD většinou bude jednat o dočasné oplocení, jako jsou např. oplocenky, které jsou zhotovovány v lesích pro účely ochrany proti zvěři, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, není třeba k jeho budování stavební povolení, ale je třeba, pokud není plot umístěn v zastavěném nebo

zastavitelném území dle platného územního plánu, územní rozhodnutí. Podkladem územního rozhodnutí je pak mimo jiné i dokumentace dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhotovená autorizovanou osobou. Tato dokumentace není třeba jen tehdy, pokud by bylo prováděno oplocení v zastavitelném a zastavěném území, což u ZPF a PUPFL není možné. Tato alternativa přichází v úvahu pouze u ostatní plochy, v případě zařazení této plochy do zastavěného nebo zastavitelného území, kde je vyžadován pouze územní souhlas.

V okamžiku, kdy je dořešena otázka kultury i otázka oplocení, je nutno vyřešit otázku druhového složení dřevin, které mají být vysazovány. Samozřejmě je zájemce o založení plantáže RRD vázán přírodními podmínkami, ale zároveň by neměl ani opomenout, že dle § 5 odst. 4) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin do krajiny možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. Toto neplatí, pokud vlastník hospodaří dle schváleného LHP. Pokud tedy nebudou vysazovány dřeviny původní v dané lokalitě, je třeba souhlas příslušného orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností v jejímž správním pozemku se lokalita nachází. Při výsadbě RRD lze také předpokládat, že při jejich zavádění nejde v první fázi o běžné obhospodařování. Proto je v zájmu zakladatele plantáže, aby prověřil, jestli se na dané lokalitě nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a další kroky provedl v návaznosti na daná zjištění.

Již výše jsme se zmínili o plantáži a jejím možném střetu se zvěří. Tento konflikt sice nemusí nastat, zvláště pokud bude pozemek oplocen, ale přesto se o něm musíme zmínit. Pozemky, na nichž jsou plantáže zakládány, jsou, pokud vlastník nepožádá o vyjmutí těchto pozemků z honebních, pozemky honebními. Tato situace navozuje několik stavů. Pokud jsou honebními pozemky, je uživatel honitby povinen platit škody vzniklé na pěstovaných kulturách. Vlastník pozemků je pak povinen společně s uživatelem honitby bránit vzniku těchto škod. Uživatel honitby má právo vstupovat na honební pozemky a vlastník má právo uplatňovat škody způsobené zvěří. Pokud jsou tyto pozemky na návrh vlastníka z honebních vyňaty, nemůže na ně vstupovat uživatel honitby, ale zároveň za škody zvěří nenese odpovědnost.

Ještě v závěru se zmíním o pěstování RRD na PUPFL. V tomto případě je vlastník nebo uživatel vázán povinnostmi dle § 33 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, a zároveň § 4 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle lesního zákona se jedná především o velikost holé seče do 1 ha a dvojnásobku porostní výšky a o obmýetí v porostech ve věku do 80-ti let. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná především o zachování či ohrožení stabilizační funkce významných krajinných prvků, kterým je dle téhož zákona každý les.

Kontakt

Ing. Jana Svobodová

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

e-mail: jana.svobodova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 497